




TIPOS DE SONDAS Y ACCESOS

ACCESO NASAL: NO INVASIVAS

- Sonda nasogástrica (SNG)
- Sondas nasoentéricas (SNE)

ACCESO DIRECTO EN ESTÓMAGO O INTESTINO: INVASIVAS

- Gastrotomías
- Gastroyeyunostomías
- Yeyunostomías



REGISTRO NACIONAL NED - GRUPO NADYA (AÑO 2015)

Prevalencia: 8/100.000 hab



¿QUÉ MÁS NECESITO?

- **Materiales con conexión ENFit** (color específico, no conecta con otros sistemas)



- **Jeringa:** 50-60 cc
- **Jeringas** 20 cc (medicación)



- **Árbol / palo de gotero**
- **Contenedor universal**
Únicamente si no se puede conectar la nutrilínea al envase de la NE, por ejemplo en caso de fórmulas en polvo para reconstituir.
- **Bombas**

ADMINISTRACIÓN

INTERMITENTE POR BOLOS:

Administración de volúmenes pequeños (<300 cc) en cortos períodos de tiempo (10 ml/min).

INTERMITENTE POR GRAVEDAD O BOMBA DE INFUSIÓN:

Períodos de infusión por goteo irregular alternando con reposo. Tomas de 60-90 min.

CONTINUA POR GRAVEDAD O BOMBA DE INFUSIÓN:

Administración sin interrupción un nº de horas (por gravedad o bomba). Puede ser cíclica o continua en 24h.



Es el soporte nutricional domiciliario (exclusivo o complementario) a través de un tracto gastrointestinal funcionando mediante un acceso por sonda (nasal o directa a estómago/intestino), siempre y cuando la enfermedad de base esté estabilizada; permitiendo la reinserción del paciente en su entorno socio-familiar.

INDICACIONES



Alteraciones mecánicas de la deglución/tránsito que cursan con afagia o disfagia grave.



Trastornos neuromotores que impiden la deglución o el tránsito.



Requerimientos especiales de energía y/o nutrientes.



Desnutrición

CONTACTE SIEMPRE CON EQUIPO SANITARIO:

En cualquiera de las complicaciones mencionadas, si éstas no mejoran con las recomendaciones dadas, o:

⚠ **Si tiene fiebre de 38°C o superior**

⚠ **Si la zona del estoma está enrojecida o supura o sale contenido alrededor**

⚠ **Si nota que la sonda se oscurece, presenta grietas u orificios**

Recambio de sonda según las recomendaciones de su equipo sanitario

CUIDADOS BÁSICOS



CUIDADOS Y LIMPIEZA DEL MATERIAL



CUIDADOS DE LA BOCA



HIGIENE DE MANOS



CAMBIOS DE SISTEMA DE INFUSIÓN O CONTENEDOR: DE 1 A 2 DÍAS

**Seguir indicaciones proporcionadas según tipo de sonda.*

PRINCIPALES COMPLICACIONES



OBSTRUCCIÓN DE LA SONDA



EXTRACCIÓN DE LA SONDA



NÁUSEAS Y VÓMITOS



DIARREA



ESTREÑIMIENTO

FÓRMULAS ENTERALES

Las fórmulas completas de NE se componen de hidratos de carbono, proteínas y grasas, enriquecidas con vitaminas y minerales, siendo el agua un 80% de su composición.

¿Quieres obtener más información o conocer más detalles?

www.seen.es