HIPERTIROIDISMO

Amaya Barragán Angulo. Adjunto del Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.
 María Elena López Alaminos. Adjunto del Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.
 Francisco Javier Acha Pérez. Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción

El hipertiroidismo es el estado clínico que resulta del exceso de hormonas tiroideas. La incidencia en Europa es de 51,04 por 100.000 habitantes/año. Existen diversas causas, siendo la más frecuente la enfermedad de Graves-Basedow, seguida del bocio multinodular tóxico. El diagnóstico etiológico es primordial para decidir el manejo terapéutico correcto. La enfermedad de Graves-Basedow es una enfermedad sistémica autoinmune causada por anticuerpos IgG circulantes que se unen y activan la proteína G del receptor de la TSH. Representa el 60-80% de todas las causas. La distribución por sexo es claramente femenina, con una relación 10:1, con pico de incidencia de 40-60 años.

Causas

El hipertiroidismo puede clasificarse según su origen:

- Enfermedades primarias tiroideas:
 - Enfermedad de Graves-Basedow (EGB).
 - Bocio multinodular/adenoma tóxico.
 - Tiroiditis.
 - Efecto Jod-Basedow.
 - Hipertiroidismo por fármacos.
 - Mutación activadora proteína Gs.
 - Mutación activadora del receptor TSH.
- Hipertiroidismo extratiroideo:
 - Adenoma productor de TSH.
 - Resistencia a las hormonas tiroideas.
 - Elevación de β -hCG: coriocarcinoma, mola hidatiforme, hiperemesis gravídica.
 - Tirotoxicosis facticia o sobretreatmento.
 - Tejido tiroideo ectópico: metástasis, cáncer folicular o estruma ovárico.

Clínica

Insomnio, irritabilidad, labilidad emocional

Pérdida ponderal 52-85%
Intolerancia al calor 41-89%
Fatigabilidad 44-88%

Ginecomastia
Tembor 40-97%
Manos calientes y húmedas 72-76 %

Osteoporosis
Edad ósea adelantada
Irregularidades menstruales

Bocio tiroideo
Hiperdefecación
Hiperfagia

Taquicardia 58% Fibrilación auricular 29%

Crisis tirotóxica:
Expresión de todos los síntomas de tirotoxicosis que llegan a desencadenar: disfunción multiorgánica, cerebral, cardiovascular y hepática y con un signo común que es la fiebre. Mortalidad de 10-30%.

Existen síntomas específicos de la enfermedad de Graves-Basedow:

Orbitopatía. Dermopatía y acropaquias.

Diagnóstico

- Anamnesis: historia de síntomas, antecedentes personales y familiares
- Exploración física: auscultación y palpación del tiroides. Toma de temperatura, presión arterial y frecuencia cardíaca. Movimientos oculares.
- Laboratorio:
 - Niveles suprimidos o bajos de TSH y elevación de T4 libre (T4L) y T3 libre (T3L). Se denomina hipertiroidismo subclínico a los niveles suprimidos de TSH y normales de T3L y T4L.
- Pruebas de imagen: gammagrafía (GGT) y ecografía tiroidea.

Típico en enfermedad Graves-Basedow:

- Anticuerpos antitiroideos (TRAb) positivos
- GGT: hipercaptación difusa
- Ecografía: vascularización aumentada

Tratamiento de la enfermedad de Graves-Basedow:

Los antitiroideos (AT), radioyodo y la cirugía son las posibilidades actualmente:

- La primera línea del tratamiento son los AT; el metimazol es el más utilizado en España. Utilizando el propiltiouracilo (PTU) de segunda línea o primer trimestre de gestación.
- Efectos secundarios más frecuentes: exantema, urticaria, artralgias. Muy raros: agranulocitosis, hepatitis y vasculitis.
- El tratamiento debe mantenerse 12-18 meses.
- Si aparecen efectos secundarios o imposibilidad de retirada de los AT por persistencia, se debe valorar la terapia con cirugía o radioyodo.

Tirotoxicosis y gestación:

- Es primordial diferenciar entre hipertiroidismo gestacional transitoria (no tratamiento) o enfermedad de Graves-Basedow.
- En la enfermedad de Graves-Basedow, el PTU será el fármaco de elección en primer trimestre y metimazol, posteriormente.
- Se debe mantener el nivel de T4L en el límite superior con la menor dosis farmacológica posible.
- Se debe medir la T4L y la TSH cada 2-4 semanas al inicio del tratamiento y cada 4-6 semanas cuando el paciente esté en objetivos.
- La medición de TRAb se realizará al inicio de la gestación y a las 18-22 semanas, atraviesan la placenta, y altos valores se han asociado a mayor riesgo fetal.

No olvides...

- El hipertiroidismo es debido al aumento de hormonas tiroideas. La enfermedad de Graves-Basedow es la causa más frecuente.
- Es primordial realizar un adecuado diagnóstico diferencial entre todas las causas.
- Actualmente el tratamiento de elección son los fármacos de antitiroideos, relegando el tratamiento con radioyodo o cirugía en casos refractarios o efectos secundarios.
- Se debe realizar un seguimiento muy estrecho en la enfermedad de Graves-Basedow en el embarazo, sobre todo si los TRAb están elevados por la posible afectación neonatal.
- La crisis tiroidea es una emergencia clínica con alto riesgo de mortalidad.